



# I N D I A

Conscious Care.

### IMAGEL BLATTE

**Insetticida in esca alimentare a base di imidacloprid per il controllo di ogni specie di blatta**

Presidio Medico-Chirurgico Registrazione Min. della Salute n° 19362 (Bayer CropScience)

**Composizione, 100 g. di formulato contengono:**

Imidacloprid		g	2,15
Esca alimentare, coformulanti	q.b. a	g	100

Famiglia del principio attivo <b>Imidacloprid</b>	Neonicotinoidi (cloronicotinili)
Modalità d'azione	Principalmente per ingestione
Attività insetticida	svolge una marcata azione insetticida alterando la funzionalità del sistema nervoso
Stadio di sviluppo colpibile	attivo contro stadi giovanili e stadi adulti

**Formulazione**

In Imigel Blatte l'imidacloprid è contenuto all'interno di un gel che svolge la funzione di esca alimentare, appositamente formulata per risultare appetibile alle varie specie di blatte e mantenersi stabile per un lungo periodo di tempo.

**Compatibilità**

Imigel Blatte **non** deve essere applicato su superfici recentemente trattate con insetticidi convenzionali.

**Principali infestanti controllabili**

Con Imigel Blatte è possibile controllare tutti gli stadi giovanili e gli adulti di *Blattella germanica*, *Blatta orientalis*, *Periplaneta americana*, *Supella longipalpa*.

L'azione insetticida inizia a manifestarsi da 1 a 2 giorni dopo l'applicazione, momento in cui si osservano le prime blatte morte.

In seguito Imigel Blatte si mantiene attivo per un lungo periodo dall'applicazione (se non rimosso con lavaggi o altre pulizie).

**Ambiti di applicazione**

Imigel Blatte, grazie alla mancanza di effetti collaterali indesiderati (rilascio di odori, danneggiamento delle superfici) è adatto al trattamento dei seguenti ambienti:

- interno di abitazioni;
- locali ove si preparano, porzionano, confezionano, conservano e somministrano cibi e bevande (avendo cura che il formulato non giunga a contatto con gli alimenti);
- edifici aperti al pubblico (ospedali, case di riposo, scuole,...);
- locali industriali e commerciali;
- mezzi di trasporto in genere.

In tali aree avvalendosi dei dati ottenuti tramite il monitoraggio e/o sopralluoghi appositi è necessario individuare i siti abitualmente frequentati dalle blatte. In particolare devono essere ricercati ed individuati le aree ove le blatte reperiscono con facilità i residui organici che fungono da alimento e gli anfratti (fessure, crepe, angoli morti, tubature inutilizzate, condotte



# I N D I A

Conscious Care.

d'aria, ...) che servono da rifugio diurno per le blatte. Un aiuto può essere fornito dal fatto che le blatte amano i luoghi caldo-umidi e rifuggono la luce solare e quella **artificiale**.

### **Dove, come e quando si applica** Imagel Blatte

**Dove:** il prodotto è formulato in pasta gelatinosa e va applicato sulle superfici ove si concentra il transito delle blatte, le superfici –se possibile- è bene vengano pulite o almeno siano rimossi i residui organici che possono costituire alimento per le blatte.

**Come:** la pasta gelatinosa è dotata di una naturale capacità di aderire alle superfici su cui viene applicata. Individuato il punto ove si desidera applicare Imagel Blatte è sufficiente esercitare una lieve pressione sul grilletto della pistola erogatrice (per le istruzioni relative all'inserimento delle cartucce sulla pistola leggere le istruzioni allegate alla pistola).

**Quando:** il prodotto può essere utilizzato:

- per interventi di profilassi in luoghi soggetti a reinfestazione (ad es. magazzini di ricevimento merci) ad opera delle blatte;
- per mantenere un'azione di presidio dopo l'applicazione di insetticidi tradizionali;
- per combattere infestazioni al loro inizio.

### **Dosaggi**

Nella tabella seguente si espongono le dosi suggerite per l'applicazione di Imagel Blatte sulle superfici dei locali infestati:

Specie di blatta	Bassa densità di infestazione	Alta densità di infestazione
<i>Blattella germanica</i> , <i>Supella longipalpa</i>	1-2 gocce per metro quadrato	3 gocce per metro quadrato
<i>Blatta orientale</i> , <i>Periplaneta americana</i>	1-2 gocce per metro quadrato	3 gocce per metro quadrato

1 goccia di circa 5 mm di diametro è pari a 0,1 g circa di Imagel Blatte.

Alcuni importanti suggerimenti per una corretta applicazione: le blatte percepiscono la presenza dell'esca alimentare in un raggio di circa 30-40 cm, pertanto suddividendo le dosi nell'area infestata si aumentano le probabilità del contatto esca-blatte. Al fine del calcolo della quantità complessiva di esca da posizionare deve essere considerata tutta la superficie del locale infestato e non solo quello della porzione di area in cui si è direttamente osservata la presenza delle blatte. L'esca alimentare deve essere applicata in luoghi poco illuminati e lontani da forti fonti di calore

### **Classificazione del formulato**

Per tali informazioni si rinvia alla scheda di sicurezza.

### **Avvertenze**

Per un corretto uso del prodotto attenersi scrupolosamente a quanto riportato in etichetta. Leggere e conservare la scheda di sicurezza. Non contaminare persone ed animali, cibi e bevande e recipienti ad essi destinati. Il produttore non assume responsabilità alcuna nei confronti di terzi, chi utilizza il prodotto è responsabile per eventuali danni derivanti dal suo impiego.

### **Confezione**

Imagel Blatte è disponibile in cartucce da 30 g in scatole da 4 pezzi.